

# 定期予防接種について

むつ市健康福祉部健康づくり推進課

種類	対象年齢	標準的な接種年齢	接種回数	接種間隔等	
二種混合(ジフテリア・破傷風)	2期	11歳以上13歳未満	小学6年生	1回 予診票は小学6年時の春頃送付	
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)	1期初回	生後2月から90月(7歳半)に至るまで	生後2～7月	3回 20日以上、標準的には20日から56日までの間隔をおく	
	1期追加		1期初回終了後6～18月	1回 1期初回接種終了後6月以上の間隔をおく	
MR(麻しん・風しん)	1期	生後12月から24月に至るまで		1回	
	2期	5歳以上7歳未満であって、小学校就学前の1年間	年長児	1回 予診票は年長児の春頃送付	
BCG		生後1歳に至るまで	生後5～7月	1回	
日本脳炎	1期初回	生後6月から90月(7歳半)に至るまで	3歳	2回 6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおく	
	1期追加		4歳	1回 初回接種終了後6月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に接種	
	2期	9歳以上13歳未満	小学4年生	1回 予診票は小学4年時の春頃送付	
日本脳炎(特例措置)	1期初回～2期	平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の方		接種間隔は、乳幼児の日本脳炎と同様。接種歴によって残りの接種回数が異なる。 2期の接種は、制度上は1期追加終了後6日以上の間隔をおけば接種できますが、概ね5年の間隔を置いて接種することが望ましい。	
ヒブ(インフルエンザ菌b型)	生後2～60月(5歳)未満 ※接種開始時期によって接種回数が変わります。	生後2月から7月に至るまで	接種開始時期が生後2月から7月に至るまでの間	4回 (初回3回、追加1回)	・初回:27日以上、標準的には27日から56日までの間隔で3回接種(医師が必要と認めるときは20日以上) ・追加:初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13月の間隔をあけて1回接種 ※ただし初回2回目及び3回目の接種は、生後12月以降に行う。超えた場合行わない。追加接種は可能だが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔を置いて1回接種
				3回 (初回2回、追加1回)	・初回:27日以上、標準的には27日から56日までの間隔で2回接種(医師が必要と認めるときは20日以上) ・追加:初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13月の間隔をあけて1回接種 ※ただし初回2回目の接種は生後12月以降に行う。超えた場合行わない。追加接種は可能だが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔を置いて1回接種
				1回	
小児用肺炎球菌	生後2～60月(5歳)未満 ※接種開始時期によって接種回数が変わります。	生後2月から7月に至るまで	接種開始時期が生後2月から7月に至るまでの間	4回 (初回3回、追加1回)	・初回:生後24月以降、標準的には生後12月までに27日以上の間隔を置いて3回接種 ※ただし初回2回目の接種は生後12月以降に行う。超えた場合、3回目の接種は行わない。 ・追加:初回接種終了後60日以上の間隔を置いて生後12月以降、標準的には生後12～15月以降に1回接種
		生後7月から12月に至るまで		3回 (初回2回、追加1回)	・初回:生後24月以降、標準的には生後12月までに27日以上の間隔を置いて2回接種 ※ただし初回2回目の接種は生後24月以降に行う。超えた場合は行わない。 ・追加:初回接種終了後60日以上の間隔を置いて生後12月以降に1回接種
		生後12月から24月に至るまで		2回	60日以上の間隔を置いて2回接種
		生後24月から60月に至るまで		1回	
水痘	初回	生後12月から36月に至るまで	生後12～14月	1回	
	追加		初回終了後6～12月	1回 初回接種終了後6月以上の間隔をおく	
B型肝炎		生後1歳に至るまで	生後2～8月	3回 27日以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔を置いて1回接種	
ポリオ(急性灰白髄炎)	初回	生後2月から90月(7歳半)に至るまで	生後2～11月	3回 20日以上の間隔をおく	
	追加		初回終了後12～18月	1回 初回接種終了後6月以上の間隔をおく	
ロタウイルス (右記のいずれかを選択)	1価	生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日まで	初回接種は、生後2月～生後14週6日	2回 27日以上の間隔をおく	
	5価	生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日まで		3回 27日以上の間隔をおく	
子宮頸がん	シルガード9 (9価)	小学6年生から高校1年生の女子 ※シルガード9(9価)は15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回での接種完了を可能とする。	中学1年生	2回	15歳に達する前に接種を開始した場合 ・初回接種の6月後に2回目を接種 ただし、初回接種から5カ月未満で2回目を接種した場合は合計3回の接種となる。
				3回	・標準的には2月の間隔を置いて2回接種後、1回目から6月の間隔を置いて1回接種(3回目の接種は2回目の接種後から4月の間隔をあける) ・上記方法をとることができない場合は、1月以上の間隔を置いて2回接種後、2回目から3月以上の間隔を置いて1回接種
RSウイルス		妊娠28週0日から36週6日		1回	

